

Statuts de protection



Listes
rouges

Isère : EN (En danger)

R-A : VU (Vulnérable)

France : LC (Préoccupation mineure)

Directives
européennes


Inscrite à la directive "oiseaux"

Non concernée par la directive "habitats"



©R.Bussiere

Coordination départementale spécifique



Sources : UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006. - ©IGN®GeoFla - LPO Isère, in <http://www.faune-isere.org/> Novembre 2014

Distribution en Isère

Le faucon pèlerin peut être observé sur une large partie du territoire isérois. Cependant, bien qu'il ne soit pas un nicheur rupestre exclusif, il reste largement inféodé aux falaises rocheuses. En période d'hivernage, il se rencontre aussi dans les plaines où il trouve de nombreuses proies en hivernage ou en halte migratoire.

Écologie locale


Sa distribution est liée au substrat écologique : il fréquente principalement les falaises calcaires, comme celles présentes dans le massif du Vercors, et a, au contraire, tendance à éviter les parois cristallines comme celles du massif de Belledonne. On l'observe également de plus en plus en milieu urbain (cathédrales, grands bâtiments...).

Tendance évolutive

La population iséroise est assez stable, voire en légère augmentation depuis 2004 (source: lpo mission rapace) Cependant, l'espèce reste soumise à la dégradation de son habitat et à la surfréquentation des milieux naturels (sports de plein air). On observe aussi une modification de sa répartition puisque l'espèce occupe de plus en plus de milieux anthropisés qui lui apportent une relative tranquillité, des proies en abondance et qui la protègent de son prédateur naturel, le grand duc d'Europe.

Phénologie saisonnière

Les faucons pèlerins sont présents toute l'année en Isère. On peut les observer parader dès le mois de janvier et jusqu'en février. Ils sont cependant contactés principalement durant le printemps, période à laquelle les mâles doivent nourrir les jeunes et la femelle.



Nombre cumulé de données mensuelles récoltées (2000-2014)

Gestion favorable pour cette espèce

Milieus agricoles

Maintien des linéaires végétalisés (haies, ripisylves...)

✓ Réduction des intrants

Maintien d'une couverture herbacée sous une culture ligneeuse (vigne, arboriculture...)

Création de bandes enherbées

Maintien des milieux ouverts (prairies, marais, coteaux...)

Gestion raisonnée du pâturage

Gestion raisonnée des fauches

Forêts

Maintien d'arbres à cavité, d'arbres morts au sol ou sur pied

Gestion forestière en mosaïque

Favoriser le vieillissement

Diversification des strates

Diversification des pratiques

Zones humides

Maintien d'un réseau de zones humides

Diversification des berges (roselières...)

Réduction des obstacles de franchissement (seuils, endiguements, ponts...) sur les cours d'eau

Lutte contre les espèces envahissantes le long des cours d'eau

Milieus rupestres et souterrains

✓ Contrôle de la fréquentation des falaises et/ou des sites souterrains

Éviter l'engrillagement

Maintien, création de murets et/ou pierriers

Activités humaines, bâti

✓ Absence de perturbation à moins de 300m du nid ou du gîte

✓ Réduction du dérangement à proximité directe du gîte ou du nid

✓ Conservation de gîtes favorables dans le bâti

Résorption des points d'écrasements routiers (passage à faune aérien, souterrain...)

Gestion adaptée de la végétation des bords de route

Pour aider la LPO à protéger cette espèce, vous pouvez :

> Signaler la présence de l'espèce à la LPO Isère (www.faune-isere.org ou application "Naturalist") afin de compléter les connaissances sur la répartition de l'espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

> Signaler les éventuels travaux constatés sur des sites accueillant l'espèce.

Rédacteur : M. Perrot

Version : Mar-16